SOLUÇÕES PARA
**O TRATAMENTO DO
AVC ISQUÊMICO**
DISPOSITIVO DE
REVASCULARIZAÇÃO
SOLITAIRE™ X
RESULTADOS
COMPROVADOS

UMA DIFERENÇA QUE
VOCÊ PODE SENTIR¹
COM UMA PRECISÃO QUE
VOCÊ PODE VER²

Solitaire™ X

Dispositivo de Revascularização

USO SEGURO E EFICAZ EM VASOS TÃO PEQUENOS COMO 2.0mm

TODOS OS TAMANHOS COMPATÍVEIS COM MICROCATETER DE 0.021"

ZONA DE CAPTURA

COMPRIMENTO ÚTIL

MARCADOR PROXIMAL

MARCADORES DISTAIS

MARCADORES COM ESPAÇAMENTO UNIFORME

FIO DE ENTREGA MAIS LONGO^{3,4} 200CM

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS⁵ SOLITAIRE™ X

Modelo	Diâmetro Recomendado do Vaso ^A (mm)		ID Mínimo do Microcateter (pol)		Comp. do fio de entrega (cm)	Diâmetro do Stent (mm)	Comp. Útil ^B (mm)	Comp. do Stent (mm)	Comp. da ponta distal ao marcador Flourosafe (cm)	Marcadores Radiopacos		Espaçamento dos Marcadores Radiopacos (mm)
	(min)	(max)	(min)	(max)						Distal	Prox.	
SFR4-4-20-05	2.0	4.0	0.021	0.027	200	4.0	20.0	31.0	<130	3	1	5
SFR4-4-20-10	2.0	4.0	0.021	0.027	200	4.0	20.0	31.0	<130	3	1	10
SFR4-4-40-10	2.0	4.0	0.021	0.027	200	4.0	40.0	50.0	<130	3	1	10
SFR4-6-20-10	2.0	5.5	0.021	0.027	200	6.0	20.0	31.0	<130	4	1	10
SFR4-6-24-06	2.0	5.5	0.021	0.027	200	6.0	24.0	37.0	<130	4	1	6
SFR4-6-40-10	2.0	5.5	0.021	0.027	200	6.0	40.0	47.0	<130	4	1	10

Até 3 passagens de recuperação⁵

1. TR-NV16168 Rev A
2. TR-NV12692 Rev A
3. DWGS31642 Rev A
4. Comparado ao Solitaire™ Platinum
5. 71042-001 Rev A

- A. Baseado no menor diâmetro do vaso no local do trombo.
B. Comprimento utilizável que é pelo menos tão longo quanto o comprimento do trombo.

Consulte as Instruções de uso do produto para obter mais informações sobre indicações, avisos, precauções e contraindicações

ATENÇÃO: A lei federal restringe a venda deste dispositivo a um médico ou por ordem de um médico. Indicações, avisos e restrições de uso podem ser encontradas no manual do produto fornecido com cada dispositivo.

INDICAÇÕES: O dispositivo de revascularização Solitaire™ X destina-se a ser utilizado na restauração do fluxo de pacientes com AVC isquêmico devido a uma grande oclusão vascular intracraniana. Os pacientes ineligíveis para terapia com o ativador de plasminogênio tecidual intravenoso (t-PA IV) ou que não respondem à terapia com t-PA IV são candidatos ao tratamento. O dispositivo de revascularização Solitaire™ X deve ser utilizado apenas por médicos treinados em neurorradiologia intervencionista e no tratamento de AVC isquêmico.

CONTRAINDICAÇÕES: O uso do dispositivo de revascularização Solitaire™ X é contraindicado nas seguintes circunstâncias:

- Pacientes com hipersensibilidade conhecida ao níquel-titânio.
- Pacientes com estenose e/ou stent pré-existente proximal ao local do trombo que possa impedir a recuperação segura do dispositivo de revascularização Solitaire™ X.
- Pacientes com sinais angiográficos de dissecação da carótida.

PRECAUÇÕES:

- O dispositivo de revascularização Solitaire™ X deve ser utilizado apenas por médicos treinados em neurorradiologia intervencionista e no tratamento de AVC isquêmico.
- Os operadores devem tomar todas as precauções necessárias para limitar as doses de raios X sobre si mesmos e sobre os pacientes usando proteção suficiente, reduzindo o tempo de fluoroscopia e, sempre que possível, modificando os fatores técnicos dos raios X.
- Inspeção cuidadosamente a embalagem estéril e o dispositivo de revascularização Solitaire™ X antes do uso para verificar que nenhum deles sofreu danos durante o transporte. Não utilize componentes dobrados ou danificados.
- O dispositivo de revascularização Solitaire™ X não deve ser utilizado após a data de validade impressa no rótulo do produto.
- Consulte a documentação apropriada do fabricante do ativador de plasminogênio tecidual intravenoso (t-PA IV) para obter indicações, contraindicações, avisos, precauções e instruções de uso.

• Inicie o tratamento de tromboectomia mecânica o mais rápido possível.

ADVERTÊNCIAS: Terapia antiplaquetária e anticoagulante apropriada deve ser administrada de acordo com a prática médica padrão.

• Administre o t-PA IV o mais rápido possível para todos os pacientes indicados para receber o medicamento. Não cause atrasos nesta terapia.

• Não aplique torção ao dispositivo de revascularização Solitaire™ X.

• Para a segurança vascular, não realize mais de três tentativas de recuperação no mesmo vaso utilizando dispositivos de revascularização Solitaire™ X.

• Para a segurança do dispositivo, não utilize cada dispositivo de revascularização Solitaire™ X para mais de três recuperações de restauração do fluxo.

• Para cada novo dispositivo de revascularização Solitaire™ X, utilize um novo micro cateter.

• O dispositivo de revascularização Solitaire™ X não permite separação eletrolítica.

Medtronic

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85
Cidade Monções, São Paulo - SP
CEP 04576-010, Brasil

Telefone: +55 11 2182-9200

medtronicbrasil.com.br

© 2020 Medtronic. Todos os direitos reservados. Setembro/2020

Registro ANVISA: Solitaire X - 10349000968